



ดูภาพนำรู้ดูชุมชน

“บริการดี มีน้ำใจ ซื่อสัตย์”

www.thatoomHSP.com

Tel.0-4459-1126

ชวนลูกศึกษาและประชาสัมพันธ์ รพ.ท่าตูม

อาการหลังฉีดวัคซีน

หลังฉีดวัคซีนอาจพบอาการข้างเคียงของวัคซีน ของวัคซีนแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไป และเด็กแต่ละคนมีอาการและระดับความรุนแรงแตกต่างกันออกไป รุนแรงแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของร่างกายต่อวัคซีนชนิดนั้นๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับความรุนแรงดังนี้



อาการหลังฉีดวัคซีนที่ไม่รุนแรง

- ปวดหัว, การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
- คัดจมูก, เจ็บคอ, ปวดข้อ
- ปวดท้อง, ไอ, คลื่นไส้
- ท้องร่วง
- ไข้
- มีผื่น

อาการหลังฉีดวัคซีนที่รุนแรง

อาการรุนแรงหลังฉีดวัคซีนพบได้น้อย โดยประมาณ 1 คนใน 100 ภายใน 6 เดือนของการฉีดวัคซีน เป็นการติดตามระยะยาวและแพทย์เป็นผู้วินิจฉัย ได้แก่

- เลือดในปัสสาวะหรืออุจจาระ
- ปอดบวม
- การอักเสบของกระเพาะอาหารหรือลำไส้

1. หลังฉีดวัคซีน มีตุ่มหนอง

5 อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

และการดูแลเบื้องต้น



หลังฉีดวัคซีน มีตุ่มหนอง



Mama Expert Thailand
@MamaExpertThailand



ตุ่มหนองแดงและกลายเป็นหนองพบได้หลังฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 3-4 สัปดาห์ พบได้ในการฉีดวัคซีน ปีซีจี (วัคซีนป้องกันวัณโรค) ส่วนใหญ่ฉีดบริเวณไหล่ข้างซ้าย และน้อยโรงพยาบาลที่จะฉีด บริเวณก้น

การดูแลหลังฉีดวัคซีน มีตุ่มหนอง

ถ้าแผลไม่แตกไม่ต้องทำอะไร ในกรณีแผลมีเลือดหรือหนองไหลออกมา ให้คุณแม่ใช้สำลีสะอาดชุบน้ำเกลือหรือนอร์มัลซาลินเช็ดที่แผลเบาๆจนกว่าแผลจะสะอาด และเช็ดแอลกอฮอล์ 70 เซ็นโตรอบๆแผลอีกครั้ง

2. หลังฉีดวัคซีน มีอาการปวด บวม แดง

5 อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

และการดูแลเบื้องต้น



หลังฉีดวัคซีน มีอาการปวด บวม แดง



Mama Expert Thailand
@MamaExpertThailand



บริเวณที่ฉีดวัคซีน ปวดมาก ลูกน้อยอาจโยเย ร้องกวนได้

การดูแลหลังฉีดวัคซีน มีอาการปวด บวม แดง

คุณแม่ใช้เจลเย็น หรือผ้าห่อน้ำแข็ง หรือผ้าชุบน้ำเย็นจัดประคบบริเวณที่ปวดบวม กรณีประคบด้วยความเย็นจะทำในทันที ที่ลูกฉีดวัคซีนแล้วปวดบวม หลังจาก 48 ชั่วโมง เปลี่ยนไปเป็นวิธีประคบอุ่นแทน ทำได้โดย ใช้น้ำอุ่นประคบบริเวณที่ปวด ถ้ายังไม่ดีขึ้นอาจให้รับประทาน ยาแก้ปวด (สำหรับเด็ก) เพื่อช่วยให้อาการทุเลาลง

3. หลังฉีดวัคซีนแล้วมีไข้

5 อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

และการดูแลเบื้องต้น



หลังฉีดวัคซีนแล้วมีไข้



Mama Expert Thailand
@MamaExpertThailand



อาการมีไข้ตัวร้อน เป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดหลังฉีดวัคซีน คุณแม่หลายคนมีความเข้าใจผิด กินยาลดไข้ ดักไว้ก่อน เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างมาก การดูแลที่ถูกต้องทำได้ดังนี้

การดูแลลูกหลังฉีดวัคซีนแล้วมีไข้

1. คุณพ่อคุณแม่ควรเช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดา ไม่ควรใช้น้ำเย็นจัด เพราะจะทำให้หลอดเลือดตีบ และระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ยาก นอกจากนี้ยังทำให้เกิดอาการหนาวสั่นได้ ควรป้อนยาลดไข้ทันทีเมื่อมีไข้ร่วมกับการเช็ดตัวลดไข้ ยาลดไข้จะออกฤทธิ์ลดไข้หลังรับประทานยา 30 นาทีและออกฤทธิ์สูงสุด 1 ชั่วโมง คงสภาพได้ 4 ชั่วโมง ดังนั้นหากไข้สูงระหว่างมื้อยา ให้เช็ดตัวลดไข้ หากมีอาการหนาวสั่นควรให้ความอบอุ่นก่อนแล้วจึงเช็ดตัว

2. ให้ลูกดื่มน้ำมากๆ ควรเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำผลไม้ กระตุ้นให้ดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อชดเชยน้ำที่ร่างกายสูญเสียไปจากพิษไข้
 3. ใส่เสื้อผ้าโปร่ง สวมใส่สบาย ประเภผ้าฝ้าย ไม่ควรใส่เสื้อผ้ายัดเพราะไม่ระบายความร้อน ไม่ควรใส่เสื้อผ้าหนาหรือห่มผ้าหนาๆ
 4. อยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 5. คุณแม่ควรดูแลวัดไข้ซ้ำทุกๆ 4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไข้กลับเป็นซ้ำ หากมีไข้อีกแนะนำให้ทำตามเดิม เน้นการเช็ดตัวลดไข้ หากคุณแม่ละเลยลูกอาจ ชักจากภาวะไข้สูงได้
4. **หลังฉีดวัคซีน มีผื่นตามร่างกาย**

5 อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

และการดูแลเบื้องต้น



หลังฉีดวัคซีน มีผื่นตามร่างกาย



Mama Expert Thailand
@MamaExpertThailand



Mama
Expert

ส่วนใหญ่อาการมักจะไม่รุนแรง แต่พบได้เช่นกันที่เด็กมีผื่นลูกกลมมากขึ้นตามตัว ถ้ากรณีลูกกลมควรพาลูกพบแพทย์ใกล้บ้าน

การดูแลหลังฉีดวัคซีนแล้วลูกมีผื่นตามร่างกาย

ให้สังเกตอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ชี้น อ่อนเพลีย ไม่เล่น ไม่ดูคนม หรือรับประทานอาหารไม่ได้ คุณแม่ควรพาลูกไปพบแพทย์ทันที

5. หลังฉีดวัคซีนชักจากไข้สูง

5 อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

และการดูแลเบื้องต้น



หลังฉีดวัคซีนชักจากไข้สูง



Mama Expert Thailand
@MamaExpertThailand



สาเหตุของการชักส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการฉีดวัคซีน โดยตรง แต่เกิดจากการมีไข้สูงหลังฉีดวัคซีน

การดูแลหลังฉีดวัคซีนชักจากไข้สูง

เน้นการป้องกัน จากข้อ 3 หลังจากฉีดวัคซีนแล้วต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เช็ดตัว หรือรับประทานยาลดไข้ ถ้าปล่อยให้ไข้ขึ้นสูงมากกว่า 40 องศาเซลเซียส อาจจากไข้สูงได้ หากลูกน้อยชักคุณแม่ต้อง**จดทำเพื่อความปลอดภัย**

คุณแม่จัดทำดังนี้ จับลูกให้ตะแคงศีรษะไปด้านข้าง ให้ศีรษะอยู่ในระดับต่ำเล็กน้อย เพื่อให้ทางเดินหายใจโล่ง ให้น้ำลาย เสมหะ หรือเศษอาหารไหลออกมาได้สะดวก และป้องกันไม่ให้อาหารเข้าไปอุดตันในหลอดลม ที่สำคัญควรระวังเรื่องสภาพแวดล้อมขณะนั้น ควรอยู่บนพื้นราบ ป้องกันไม่ให้ลูกได้รับอันตรายอื่น ๆ จากการตกหรือล้มในขณะที่ชักด้วย อ่านการดูแลที่ถูกต้องอย่างละเอียดเกี่ยวกับ [ลูกชักจากไข้สูง](#) หลังฉีดวัคซีน ลูกอาจไม่มีไข้หรืออาการอย่างหนึ่งอย่างใด ใน 5 ชั่วโมงหลังฉีดทันที คุณแม่ควรติดตามอาการลูก 1 สัปดาห์ ถึงจะอยู่ในระยะปลอดภัย

เรียบเรียงโดย : *Mamaexpert Editorial Team*



"สุขภาพดีของท่าน คือบริการของเรา"
รอรับรู้เรื่องสุขภาพง่าย ๆ แค่นั่งคุย...คลิกมา...

www.thatoomhsp.com

งานเสด็จศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตุม

โทร.044-591126 ต่อ 116