

ซิฟิลิส (Syphilis)



สาเหตุ : เกิดจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Treponema pallidum

ระยะฟักตัว : ประมาณ 10 – 90 วัน

การติดต่อ 1. โดยทางเพศสัมพันธ์
2. มารดาที่กำลังตั้งครรภ์และเป็นโรคซิฟิลิส
ทารกจะติดโรคไปด้วย

อาการ : มีแผลที่อวัยวะเพศ และอาจเกิดที่อื่นๆ
แผลไม่เจ็บ ถ้าไม่ได้รับการรักษาก็หายได้เอง
: มีผื่นขึ้นทั่วตัว ที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ไม่เจ็บ ไม่คัน
ผมร่วง คิ้วร่วง ฯลฯ อาการเหล่านี้จะหายได้เอง
แต่เชื้อยังคงอยู่ในร่างกาย ดังนั้น ถ้าตรวจเลือด
จะพบว่า เลือดบวก (มีเชื้อซิฟิลิสในร่างกาย)
: หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษา โรคจะลุกลาม
ทำลายอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย เช่น หัวใจ
เส้นเลือด สมอง กระดูก ทำให้พิการและตายได้

ซิฟิลิสแต่กำเนิด ทารกที่ติดโรคซิฟิลิสจากมารดาทำให้
ทารกแท้งหรือตายได้ ทารกบางคนที่รอดชีวิต เมื่อโตขึ้น
อาจจะตั้งกระดูก ปากแหว่ง เพดานโหว่ ตาบอด

หนองใน (Gonorrhoea)

สาเหตุ : เกิดจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Neisseria gonorrhoeae

ระยะฟักตัว : ประมาณ 2 – 10 วัน (โดยทั่วไป 5 วัน)

การติดต่อ : โดยทางเพศสัมพันธ์

อาการ : **ในผู้ชาย** จะมีอาการปัสสาวะแสบขัด มีหนอง
ไหลจากท่อปัสสาวะ ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการ
แทรกซ้อน เช่น ต่อมลูกหมากอักเสบ เป็นฝีที่
ผนังของท่อปัสสาวะ ท่อปัสสาวะตีบตัน
อัมพาตอักเสบ จนอาจทำให้เป็นหมันได้
: **ในผู้หญิง** จะมีอาการตกขาว มีกลิ่นเหม็น ไม่คัน
มีการอักเสบที่ท่อปัสสาวะ ปากมดลูก และ
ทวารหนัก ผู้ป่วยบางรายมีอาการแทรกซ้อน เช่น
ต่อมบาร์โทลินอักเสบ ปีกมดลูกอักเสบ ถ้ามีการ
อักเสบรุนแรง เมื่อหายแล้วอาจทำให้ท่อรังไข่
ตีบตันกลายเป็นหมันหรือทำให้ท้องนอกมดลูกได้
: **ในทารกแรกเกิด** เชื้อหนองในอาจเข้าตาขณะ
คลอดผ่านช่องคลอดมารดาที่มีเชื้อหนองในอยู่
ถ้าไม่รีบรักษาอาจตาบอดได้



หนองในเทียม

(Non – Specific Urethritis)

สาเหตุ : เกิดจากเชื้อโรคหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่เกิดจาก

แบคทีเรียที่มีชื่อว่า Chlamydia trachomatis

ระยะฟักตัว : ประมาณ 1 – 4 สัปดาห์

การติดต่อ : โดยทางเพศสัมพันธ์

อาการ : **ในผู้ชาย** จะมีอาการแสบที่ปลายท่อปัสสาวะ
ปัสสาวะขัด มีหนองไหล หนองมักจะเป็นมูกใส
หรือมูกขุ่นๆ ไม่เป็นหนองข้นแบบหนองใน
บางรายอาจมีอาการแสบที่ท่อปัสสาวะ และมีมูก
ออกเล็กน้อยโดยเฉพาะในช่วงเช้า
: **ในผู้หญิง** ส่วนมากมักไม่มีอาการแสดง ส่วนน้อย
อาจมีตกขาว



แผลริมอ่อน (Chancroid)

สาเหตุ : เกิดจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Haemophilus ducreyi

ระยะฟักตัว : ประมาณ 4 – 7 วัน

การติดต่อ : โดยทางเพศสัมพันธ์

อาการ : จะมีแผลเล็กๆที่อวัยวะเพศ คล้ายแผลเปื่อย
ขอบไม่แข็ง และไม่เรียบ มีเลือดออก เจ็บปวด
มาก มักมีหลายแผล บางคนต่อมน้ำเหลืองที่
ขาหนีบบวมเป็นฝี เมื่อฝีแตกจะเป็นแผลใหญ่

กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง (Lymphogranuloma venereum)

สาเหตุ : เกิดจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Chlamydia trachomatis

ระยะฟักตัว : ประมาณ 3 – 30 วัน

การติดต่อ : โดยทางเพศสัมพันธ์

อาการ : จะมีตุ่มนูน ตุ่มใสหรือแผลเกิดขึ้นที่อวัยวะเพศ และหายไปเองภายใน 2 – 3 วัน ต่อมาต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบจะบวมเป็นฝี เจ็บมาก ผิวหนังบริเวณที่เป็นฝีจะมีการอักเสบ บวม แดง ร้อน บางรายฝีอาจยุบหายได้เองภายใน 2 - 3 สัปดาห์ หรือเป็นเดือน แต่บางรายฝีอาจแตก มีหนองไหล กลายเป็นแผลเรื้อรัง ลูกกลามจนทำให้ทวารหนักอักเสบตีบตัน ถ่ายอุจจาระไม่ออก



วิธีปฏิบัติตน

ป้องกันอย่างไร...ไม่ให้ติดโรค

1. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์
2. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีการร่วมเพศ
3. รักษาความสะอาดของร่างกาย และอวัยวะเพศอย่างสม่ำเสมอ

ขณะที่ป่วยและรักษา...จะปฏิบัติตัวอย่างไร

1. งดร่วมเพศโดยเด็ดขาด รวมทั้งการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค และการอักเสบลูกกลาม
2. งดดื่มเหล้า – เบียร์ และของมีเมาทุกชนิด
3. รักษาอวัยวะเพศและบริเวณใกล้เคียงให้สะอาดและแห้ง
4. นำคู่นอนไปตรวจ และรักษาโดยเร็วที่สุด
5. ในผู้ชาย - ห้ามรัดอวัยวะเพศ เพื่อดูหนองเป็นอันตราย เพื่อป้องกันการอักเสบลูกกลาม
- ให้กลั้นปัสสาวะอย่างน้อย 4 – 6 ชั่วโมง ก่อนมาตรวจครั้งต่อไป
6. อย่าซื้อรักษาด้วยตัวเอง ให้ตรวจรักษากับแพทย์เท่านั้น
7. ไปรับการตรวจตามนัดทุกครั้ง และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

จะตรวจเลือด...เมื่อ

1. ก่อนแต่งงาน
2. เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ (ไม่ควรเกิน 3 เดือน)
3. เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่น โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
4. เมื่อสงสัย หรือมีอาการผิดปกติ



โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์



ขงนศศึกษาและประจักษ์พันธ์
โรงพยาบาลท่าตุม จังหัดสุรินทร์
โทร.044-591126
www.thatoom.hsp.com