


หลังทำผ่าตัดเต้านม อาการที่ท่านอาจพบได้ มีดังนี้

1. **เจ็บปวดแผลหลังทำผ่าตัด** ท่านสามารถรับประทานยาแก้ปวดตามแผนการรักษาของแพทย์ ร่วมกับใช้ความเย็นประคบ เพื่อลดอาการบวมหรือใช้หมอนเล็กๆรองใต้รักแร้ เพื่อให้เกิดความสบายมากขึ้น



2. **อาการเจ็บคอหลังผ่าตัด** เนื่องจากแพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจขณะให้ยาสลบเพื่อทำผ่าตัด แต่อาการจะทุเลาลงประมาณ 2 – 3 วัน หลังผ่าตัด



3. **การดูแลบาดแผลหลังผ่าตัด** เมื่อครบ 24 ชม.พยาบาลจะเปิดทำแผลหลังผ่าตัด ถ้าลักษณะแผลไม่มีการติดเชื้อ อาจไม่จำเป็นต้องทำแผลทุกวัน แผลอาจมีอาการเขียวช้ำหรือบวมได้ ซึ่งอาการจะค่อยๆทุเลาลง และตัดไหมหลังผ่าตัดประมาณ 7 – 10 วัน ส่วนสายระบายสารคัดหลั่งจะยังคงไว้ จนกว่าปริมาณสารคัดหลั่งในขวดจะลดน้อยลง ท่านจะกลับบ้านพร้อมขวดระบายสารคัดหลั่ง ะมัดระวังไม่ให้สายระบายเลื่อนหรือหลุด ท่านต้องทำการจดบันทึกปริมาณ สี ลักษณะของสารคัดหลั่งทุกวัน (กำหนดเวลาบันทึกให้ตรงกันทุกวัน) เพื่อนำมาให้แพทย์ดูในวันนัดทุกครั้ง จนกว่าแพทย์จะดึงสายระบายออก หากสายระบายเลื่อนหรือหลุด ให้รีบมาพบแพทย์ทันที ท่านสามารถอาบน้ำได้หลังแพทย์ดึงสายระบายออก ประมาณ 2 – 3 วัน ถ้าไม่มีอาการผิดปกติ



4. **การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน** ขณะที่มีสายระบายอยู่ ห้ามใช้แขนข้างที่ทำผ่าตัดทำงานหรือขับรถ หลีกเลี่ยงการใช้กำลัง เช่น การยกของหนัก (ไม่ควรยกของหนักเกิน 2 กิโลกรัม ในช่วง 2 สัปดาห์แรก) การออกกำลังกายหักโหม วิธีออกกำลังกายที่ท่านสามารถทำได้ทันที คือ การเดิน การออกกำลังกายปกติ 2 สัปดาห์ ควรงดออกกำลังกายรุนแรงในช่วง 3 สัปดาห์แรก หลังการผ่าตัด ท่านสามารถกลับไปทำงานได้ปกติ ประมาณ 3 – 6 เดือนหลังทำผ่าตัด (ขึ้นกับลักษณะและประเภทของงาน)

5. **อาการชาบริเวณที่ทำผ่าตัด** แขน หรือรักแร้ ท่านสามารถใช้วิธีการนวด (อาจใช้โลชั่นช่วยทาหล่อลื่นด้วย) เพื่อกระตุ้นความรู้สึก





คำแนะนำการปฏิบัติตัว หลังทำผ่าตัดเต้านม



ด้วยความปรารถนาดี
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลท่าตูม
WWW.THATOOMHSP.COM
โทร.0-4459-1126 ต่อ 116

6. **แขนบวม** ในระยะแรกหลังผ่าตัดอาจพบ
แขนบวมได้ เป็นเรื่องปกติซึ่งสามารถหายได้
เองภายใน 2 -3 วัน จนกระทั่งถึง 2 - 3
สัปดาห์ แต่ถ้ายังมีอาการบวมอยู่หลังจากนั้น
อาจต้องมาพบแพทย์ทันที เพื่อประเมิน
อาการต่อมน้ำเหลืองโต (Lymphedema)
ท่านสามารถป้องกันภาวะนี้ได้โดยปฏิบัติดังนี้

- ห้ามฉีดยา เจาะเลือด วัดความดัน
แขนข้างที่ทำผ่าตัด
- ทาครีมกันแดด หรือใส่เสื้อแขนยาว
หรือปกอกแขน ข้างที่ทำผ่าตัด
- ระวังระวังไม่ให้ถูกแมลง สัตว์กัด
ต่อยแขนข้างที่ทำผ่าตัด

7. **การรับประทานอาหาร** ท่านสามารถ
รับประทานอาหารได้ตามปกติ โดยเฉพาะ
พวกผัก ผลไม้ เพื่อป้องกันอาการท้องผูก
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ดื่มน้ำสะอาด
หรือเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีน หรือ
แอลกอฮอล์ผสม อย่างน้อยวันละ 10 แก้ว
นอกจากนี้ควรงดสูบบุหรี่ด้วย

8. ควรมาตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้ง เพื่อ
ประเมินแผลผ่าตัด อาการแทรกซ้อน และ
ติดตามผลขึ้นเนื้อ ท่านควรรับมาพบแพทย์
ทันที หากท่านมีอาการผิดปกติดังนี้

- อาการเจ็บหรือปวดแผลผ่าตัด
ที่ไม่ทุเลาลง หลังรับประทาน
ยาแก้ปวด
- มีไข้สูงมากกว่า 100 องศา
ฟาเรนไฮต์ หรือ 37.7 องศา
เซลเซียส
- มีเลือดออกบริเวณแผลผ่าตัด
- บวมบริเวณแผลผ่าตัดหรือแขน
- รอบแผลผ่าตัดมีลักษณะแดง
หรือร้อน
- มีสารคัดหลั่งไหลออกจากแผล
ผ่าตัด หรือมีกลิ่นเหม็น
- วิตกกังวลมาก จนนอนไม่หลับ

9. ตรวจเต้านมข้างที่ทำผ่าตัด และข้างที่ปกติ
เป็นประจำทุกเดือน

10. หากท่านมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์ติดต่อ
สอบถามพยาบาลได้ตลอด 24 ชม. ที่เบอร์
โทรศัพท์ 02-5347621-2

