

ซิฟิลิส (Syphilis)



สาเหตุ : เกิดจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Treponema pallidum

ระยะฟักตัว : ประมาณ 10 – 90 วัน

การติดต่อ 1. โดยทางเพศสัมพันธ์

2. มารดาที่กำลังตั้งครรภ์และเป็นโรคซิฟิลิส
ทารกจะติดโรคไปด้วย

อาการ : มีแผลที่อวัยวะเพศ และอาจเกิดที่อื่นๆ

แผลไม่เจ็บ ถ้าไม่ได้รับการรักษาก็หายได้เอง

: มีผื่นขึ้นทั่วตัว ที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ไม่เจ็บ ไม่คัน

ผมร่วง คิ้วร่วง ฯลฯ อาการเหล่านี้จะหายได้เอง

แต่เชื้อยังคงอยู่ในร่างกาย ดังนั้น ถ้าตรวจเลือด

จะพบว่า เลือดบวก (มีเชื้อซิฟิลิสในร่างกาย)

: หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษา โรคจะลุกลาม

ทำลายอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย เช่น หัวใจ

เส้นเลือด สมอง กระดูก ทำให้พิการและตายได้

ซิฟิลิสแต่กำเนิด ทารกที่ติดโรคซิฟิลิสจากมารดาทำให้

ทารกแท้งหรือตายได้ ทารกบางคนที่รอดชีวิต เมื่อโตขึ้น

อาจจะมีกระดูกยุบ ปากแหว่ง เพดานโหว่ ตาบอด

หนองใน (Gonorrhoea)

สาเหตุ : เกิดจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Neisseria gonorrhoeae

ระยะฟักตัว : ประมาณ 2 – 10 วัน (โดยทั่วไป 5 วัน)

การติดต่อ : โดยทางเพศสัมพันธ์

อาการ : **ในผู้ชาย** จะมีอาการปัสสาวะแสบขัด มีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการแทรกซ้อน เช่น ต่อมลูกหมากอักเสบ เป็นฝีที่ผนังของท่อปัสสาวะ ท่อปัสสาวะตีตัน อันจะอักเสบ จนอาจทำให้เป็นหมันได้

: **ในผู้หญิง** จะมีอาการตกขาว มีกลิ่นเหม็น ไม่คัน มีการอักเสบที่ท่อปัสสาวะ ปากมดลูก และทวารหนัก ผู้ป่วยบางรายมีอาการแทรกซ้อน เช่น ต่อมบาร์โทลินอักเสบ ปีกมดลูกอักเสบ ถ้ามีการอักเสบรุนแรง เมื่อหายแล้วอาจทำให้ท้องแข็ง ติ่งตันกลายเป็นหมันหรือทำให้ท้องนอกมดลูกได้

: **ในทารกแรกเกิด** เชื้อหนองในอาจเข้าตาขณะคลอดผ่านช่องคลอดมารดาที่มีเชื้อหนองในอยู่ ถ้าไม่รักษาอาจตาบอดได้



หนองในเทียม

(Non – Specific Urethritis)

สาเหตุ : เกิดจากเชื้อโรคหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่เกิดจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Chlamydia trachomatis

ระยะฟักตัว : ประมาณ 1 – 4 สัปดาห์

การติดต่อ : โดยทางเพศสัมพันธ์

อาการ : **ในผู้ชาย** จะมีอาการแสบที่ปลายท่อปัสสาวะ ปัสสาวะขัด มีหนองไหล หนองมักจะเป็นมูกใสหรือมูกขุ่นๆ ไม่เป็นหนองข้นแบบหนองใน บางรายอาจมีอาการแสบที่ท่อปัสสาวะ และมีมูกออกเล็กน้อยโดยเฉพาะในช่วงเช้า

: **ในผู้หญิง** ส่วนมากมักไม่มีอาการแสดง ส่วนน้อยอาจมีตกขาว



แผลริมอ่อน (Chancroid)

สาเหตุ : เกิดจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Haemophilus ducreyi

ระยะฟักตัว : ประมาณ 4 – 7 วัน

การติดต่อ : โดยทางเพศสัมพันธ์

อาการ : จะมีแผลเล็กๆที่อวัยวะเพศ คล้ายแผลเปื่อย ขอบไม่แข็ง และไม่เรียบ มีเลือดออก เจ็บปวดมาก มักมีหลายแผล บางคนต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบบวมเป็นฝี เมื่อฝีแตกจะเป็นแผลใหญ่

กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง (Lymphogranuloma venereum)

สาเหตุ : เกิดจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Chlamydia trachomatis

ระยะฟักตัว : ประมาณ 3 – 30 วัน

การติดต่อ : โดยทางเพศสัมพันธ์

อาการ : จะมีตุ่มนูน ตุ่มใสหรือแผลเกิดขึ้นที่อวัยวะเพศ

และหายไปเองภายใน 2 – 3 วัน ต่อมาต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบจะบวมเป็นฝี เจ็บมาก ผิวหนังบริเวณที่เป็นฝีจะมีการอักเสบ บวม แดง ร้อน บางรายฝีอาจยุบหายได้เองภายใน 2 - 3 สัปดาห์หรือเป็นเดือน แต่บางรายฝีอาจแตก มีหนองไหล กลายเป็นแผลเรื้อรัง ลูกกลามจนทำให้ทวารหนักอักเสบตีบตัน ถ่ายอุจจาระไม่ออก



วิธีปฏิบัติตน

ป้องกันอย่างไร...ไม่ให้ติดโรค

1. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์
2. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีการร่วมเพศ
3. รักษาความสะอาดของร่างกาย และอวัยวะเพศอย่างสม่ำเสมอ

ขณะที่ป่วยและรักษา...จะปฏิบัติตัวอย่างไร

1. งดร่วมเพศโดยเด็ดขาด รวมทั้งการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค และการอักเสบลุกลาม
2. งดดื่มเหล้า – เปียร์ และของมีเมาทุกชนิด
3. รักษาอวัยวะเพศและบริเวณใกล้เคียงให้สะอาดและแห้ง
4. นำก้อนหนองไปตรวจ และรักษาโดยเร็วที่สุด
5. ในผู้ชาย - ห้ามรีดอวัยวะเพศ เพื่อถุงหนองเป็นอันตราย เพื่อป้องกันการอักเสบลุกลาม
- ให้อีกคันปัสสาวะอย่างน้อย 4 – 6 ชั่วโมง
ก่อนมาตรวจครั้งต่อไป
6. อย่าซื้อรักษาด้วยตัวเอง ให้ตรวจรักษากับแพทย์เท่านั้น
7. ไปรับการตรวจตามนัดทุกครั้ง และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

จะตรวจเลือด...เมื่อ

1. ก่อนแต่งงาน
2. เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ (ไม่ควรเกิน 3 เดือน)
3. เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่น โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
4. เมื่อสงสัย หรือมีอาการผิดปกติ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

