

หนองใน (Gonorrhoea)



สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ *Neisseria gonorrhoea*
ระยะฟักตัว ประมาณ 3 - 5 วัน

อาการ

ผู้ชาย จะมีอาการปัสสาวะขัด แสบ มีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ หากไม่ได้รับการรักษาเชื้อจะลงไปสู่ถุงอัณฑะทำให้เกิดอาการอักเสบอักเสบ อาจทำให้เป็นหมันได้

ผู้หญิง ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หากมีอาการจะมีตกขาวมากผิดปกติ บางครั้งมีหนองปนออกมา ปัสสาวะแสบขัดปวดท้องน้อย บางรายอาจมีฝีเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจ กลายเป็นหมัน

หนองในที่ตา เกิดได้ในกรณีที่สัมผัสกับ เชื้อโดยตรง เช่น มือสัมผัสกับหนองแล้วแฉะตา หรือทารกที่คลอดผ่านช่องคลอดของมารดาที่มีเชื้อหนองใน ถ้าไม่รักษาอาจทำให้ตาบอดได้

หนองใน ภัยทางเพศ เจ็บอันตราย ติดเชื้อง่าย



หนองในเทียม (Non - Specific Urethritis)

สาเหตุ เกิดจากเชื้อโรคหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ *Chlamydia trachomatis*

ระยะฟักตัว ประมาณ 1 - 4 สัปดาห์

อาการ

ผู้ชาย จะมีอาการแสบหรือคันที่ท่อปัสสาวะ ปัสสาวะขัด อาจมีมูกใสหรือมูกขุ่น มักพบตอนตื่นนอน

ผู้หญิง ส่วนมากมักไม่มีอาการ ส่วนน้อยอาจมีตกขาว

หนองในเทียม ไร้รุ่นแหว่ อย่าชะล่าใจ คำรักษา

คำแนะนำ ขณะป่วยและรักษา



- ในผู้ชายไม่ควรรัดอวัยวะเพศเพื่อดูหนอง เพราะจะทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้น
- ไม่ควรซื้อยารักษาตนเอง ควรตรวจรักษา กับแพทย์เท่านั้น เพราะอาจทำให้เชื้อดื้อยา รักษาไม่หาย
- ควรงดร่วมเพศ รวมทั้งสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค
- ควรดื่มเหล้า-เบียร์และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
- ไปรับการตรวจตามนัดทุกครั้ง และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
- ควรพาคู่นอนไปตรวจโดยเร็วที่สุด
- เมื่อตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ควรเจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วย
- ผู้ป่วยชายควรกลั้นปัสสาวะก่อนมาตรวจอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
- รักษาอวัยวะเพศและบริเวณใกล้เคียงให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ



โรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์

SEX
รอบคอบ
ตอบ OK

เรื่องเล็กๆ ก็มี รักษาของเรา

แสดงความห่วงใย
ด้วยการสวม
ถุงยางอนามัย
ทุกครั้ง



โรงพยาบาลท่าตุม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์



คือ กลุ่มโรคที่ติดต่อกัน
คนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งจากการร่วมเพศ
บางโรคอาจติดต่อกันโดยการสัมผัส หรือการ
ถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกขณะอยู่ในครรภ์ แบ่ง
ตามลักษณะอาการ ดังนี้

แผล ได้แก่

ซิฟิลิส แผลริมอ่อน
เริ่มอวัยวะเพศ



ฝี ได้แก่ กามโรค
ของต่อมและท่อน้ำเหลือง
หรือฝีมะม่วง



หนอง

ได้แก่ หนองใน
หนองในเทียม



อื่นๆ ได้แก่

หูดหงอนไก่ หูดข้าวสุก
พยาธิช่องคลอด
เชื้อราช่องคลอด โលน หิด



ซิฟิลิส (Syphilis)



สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ *Treponema pallidum*
ระยะฟักตัว ประมาณ 10 - 90 วัน

อาการ

ระยะแรก มีแผลที่อวัยวะเพศ หรือที่อื่นๆ แผลไม่เจ็บ
และหายเองได้ แม้ไม่ได้รับการรักษา

ระยะที่ 2 มีผื่นขึ้นตามลำตัว ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ไม่เจ็บ
ไม่คัน ผื่นร่วง ฯลฯ ระยะนี้ถ้าตรวจเลือด จะพบ **"เลือดบวก
ซิฟิลิส"**

ระยะที่ 3 หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษา โรคจะ
ลุกลามทำลายอวัยวะที่สำคัญ เช่น หัวใจ หลอดเลือด สมอง
กระดูก ทำให้พิการ และตายได้

ซิฟิลิสกรรมพันธุ์ มารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิส
ขณะตั้งครรภ์อาจแท้ง ทารกตายในครรภ์
หรือให้กำเนิดทารกที่เป็นโรคซิฟิลิส เด็ก
ที่รอดชีวิตอาจจะมีดังจมูกยุบ ปากแหว่ง
เพดานโหว่ ตาบอด



ซิฟิลิสอันตราย
อาจถึงตาย ถ้าไม่รักษา

แผลริมอ่อน (Chancroid)



สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ *Haemophilus ducreyi*
ระยะฟักตัว ประมาณ 3 - 7 วัน

อาการ

ผู้ชาย จะมีตุ่มหนองเกิดขึ้นที่อวัยวะเพศ ต่อมาแตก
เป็นแผล มักมีหลายแผล ขอบไม่แข็งและไม่เรียบ มีเลือดออก
เจ็บปวดมาก บางคนต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบบวมเป็นฝี เมื่อ
ฝีแตกจะเป็นแผลใหญ่

ผู้หญิง ส่วนใหญ่จะมีอาการเช่นเดียวกับผู้ชาย แต่
ถ้ามีแผลที่ผนังช่องคลอด หรือปากมดลูกก็อาจไม่มีอาการ
หรือมีตกขาว ปัสสาวะขัด หรือเจ็บเวลาร่วมเพศ

แผลริมอ่อน ทั่วเจ็บทั่วปวด
ถ้าไม่รีบรักษา ระวังอันตราย

