




ความรู้เรื่องโรคเรื้อน (โรคผิวหนังเนื้อขาว)

โดย

สถาบันราชประชาสมาสัย
(สถาบันวิจัย วิชาการ โรคเรื้อนและ
โรคจากการประกอบอาชีพและ
โรงพยาบาลรักษาเฉพาะทาง)



ก่อนรักษา



หลังรักษา

การวินิจฉัยโรคผิวหนังเนื้อขาวได้ในระยะที่มีอาการ
เริ่มเป็นและรีบให้การรักษาโดยเร็ว จะช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกิดความพิการได้

หากสงสัยว่ามีอาการของ
โรคผิวหนังเนื้อขาว
สามารถไปตรวจตามสถานที่ดังต่อไปนี้

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สถาบันราชประชาสมาสัย (ร.พ.พระประแดง)
15 ม.7 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทร. 02 386 8153 – 9 โทรสาร 02 754 4802
สถานบำบัดโรคผิวหนังวัดมกุฏกษัตริยาราม
โทร. 02 2823554-5

สถานบำบัดโรคผิวหนังบางเขน
(สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่1 กรุงเทพฯ)
โทร. 02 251 0158
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
420/7 ถ.ราชวิถี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 354 8036-40
แผนกโรคผิวหนัง โรงพยาบาลของรัฐบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

ในส่วนภูมิภาค



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สถานีอนามัย)
โรงพยาบาลของรัฐบาล
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค เขต
สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ จ.เชียงใหม่



สถาบันราชประชาสมาสัย
www.thaileprosy.org

โรคผิวหนังเนื้อขาว คืออะไร

โรคผิวหนังเนื้อขาวหรือโรคเรื้อน เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อนี้จะทำให้เกิดผื่นผิวหนังและทำลายเส้นประสาทส่วนปลาย หากไม่รีบรักษา อาจทำให้เกิดความพิการได้



เชื้อโรคเรื้อน
Mycobacterium leprae

อาการของโรค

ผื่นผิวหนัง เป็นวงด่างสีจางหรือแดง กว้างผื่นปกติ บริเวณรอยโรคแห้ง เหงื่อไม่ออก ขนร่วงมีอาการชาในรอยโรคและไม่คันหรือเป็นตุ่มนูนแดงทั่วตัวไม่ชา ไม่คันเป็นเรื้อรังนานมากกว่า 3 เดือน ผู้ป่วยเหล่านี้ หากไม่ได้รับการรักษา อาจทำให้เกิดความพิการบริเวณ ตา มือ และเท้า ได้



ผิวหนังเป็นวงด่างขาว

รอยโรคที่ผิวหนัง



ผิวหนังเป็นตุ่มนูนแดง

ตาหลับไม่สนิท



มือพิการ ลีบ กุด



เท้าพิการ ลีบ กุด



การติดต่อ

โรคนี้ สามารถติดต่อได้จากคนสู่คน แผลงแพร่เชื้อคือ ผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษาโดยเชื้อโรคเรื้อนจะแพร่ออกมาทางลมหายใจ ผู้ที่สัมผัสหรือคลุกคลีกับผู้ป่วยเป็นเวลานานและไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคเรื้อนจะมีโอกาสติดโรคได้ หากผู้ป่วยได้รับประทานยารักษาแล้วภายใน 3 วันจะไม่สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้

การรักษา

สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยผู้ป่วยประเภทเชือน้อย ใช้เวลารักษา 6 เดือน ผู้ป่วยประเภทเชื้อมาก ใช้เวลารักษา 2 ปี ในระหว่างการรักษา ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว และทำงานได้ตามปกติ

